Optimisation sous contrainte

Gabriel STOLTZ

stoltz@cermics.enpc.fr

(CERMICS, Ecole des Ponts & Equipe-projet MATERIALS, INRIA Rocquencourt)

Calcul scientifique, Ecole des Ponts, 05 mars 2015

Existence et unicité des minimiseurs

Panorama du cours d'aujourd'hui

On suit la même progression que pour l'optimisation sans contrainte...

Problème d'optimisation **avec** contrainte

$$\inf_{v \in K} J(v), \quad K \subset V \text{ Hilbert}$$

- **Existence** et **unicité** de minimiseurs : résultats **théoriques**
- **Caractérisation** des minimiseurs : conditions **nécessaires** voire suffisantes
 - Cas général
 - Contraintes égalité
 - Contraintes inégalité
- Une méthode **numérique** (prochain cours) : le **gradient projeté**

Existence et unicité du minimiseur

Résultat principal

- V espace de Hilbert, $K \subset V$ **convexe, fermé**

$$\forall (v, w) \in K^2, \quad \forall \theta \in [0, 1], \quad (1 - \theta)v + \theta w \in K$$

- fonctionnelle $J : K \rightarrow \mathbb{R}$ **continue, α -convexe**

$$\forall (v, w) \in K^2, \quad \langle J'(w) - J'(v), w - v \rangle_{V', V} \geq \alpha \|w - v\|_V^2$$

Alors J admet un **unique minimiseur global**

- Il faut que K soit **fermé** pour assurer l'existence !
→ se souvenir de $K =]0, 1[\subset \mathbb{R}$ et $J(v) = v$: infimum en $0 \notin K$
- Il faut que K soit **convexe** pour assurer l'unicité !
→ se souvenir de $K = [-2, -1] \cup [1, 2]$ et $J(v) = v^2$

Conditions suffisantes et extensions

- En dimension **finie** ($\dim(V) < +\infty$), on peut se passer de la convexité de la fonctionnelle et de l'ensemble pour assurer l'existence
 - $K \subset V$ fermé
 - $J : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue
 - si K n'est pas borné : J coercive sur K (i.e. $J(v) \rightarrow +\infty$ lorsque $\|v\|_V \rightarrow +\infty$)

Alors J admet au moins un minimiseur global

- En dimension **infinie**, si la fonctionnelle J est convexe mais pas α -convexe, on a existence mais pas forcément unicité
- **Unicité** : dès que V est un espace vectoriel, K convexe et J strictement convexe sur K

Exemple d'application : fonctionnelle quadratique

- On considère $V = \mathbb{R}^N$, $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ **symétrique définie positive**, $b \in \mathbb{R}^N$

$$J(v) = \frac{1}{2} (Av, v)_{\mathbb{R}^N} - (b, v)_{\mathbb{R}^N}$$

- **Contrainte** $K = \{v \in V \mid \Phi(v) = 0\}$, où, pour $d \in \mathbb{R}^N$ et $c \in \mathbb{R}$,

$$\Phi(v) = (d, v)_{\mathbb{R}^N} - c$$

- **Question** : Montrer que J admet un unique minimiseur sur K

Lesquels de ces ensembles sont convexes ?

$$K_5 = \left\{ f \in L^2(\Omega, \mathbb{C}), \int_{\Omega} |f|^2 = 1 \right\} \quad K_6 = \left\{ f \in L^2(\Omega, \mathbb{C}), \int_{\Omega} f = 1 \right\}$$

Caractérisation des minimiseurs

Cas d'un ensemble convexe fermé (1)

Minimum local : condition nécessaire

- Ensemble K **convexe, fermé**, sous-ensemble de V Hilbert
- Fonctionnelle $J : V \rightarrow \mathbb{R}$
- J admet un minimum local en u et J différentiable en u

Alors, pour tout $v \in K$, on a $\langle J'(u), v - u \rangle_{V',V} \geq 0$

Cas d'un ensemble convexe fermé (2)

- si u est un **point intérieur** de K , alors c'est point critique : $J'(u) = 0$

Réciproque : condition suffisante de minimum global

Sous les mêmes hypothèses sur K et si

- on a $\langle J'(u), v - u \rangle_{V',V} \geq 0$ pour tout $v \in K$
- J est **convexe sur K**

alors u est un minimiseur global de J sur K

- Éléments de preuve : si u est un minimum local, alors, pour $v \in K$,

$$J(u) \leq J((1 - \theta)u + \theta v) = J(u) + \theta \langle J'(u), v - u \rangle_{V',V} + o(\theta), \quad \theta \geq 0$$

On passe ensuite à la limite $\theta \rightarrow 0^+$

Pour u point intérieur : $v - u$ décrit toutes les directions possibles de V

La réciproque repose sur la propriété suivante des fonctionnelles convexes :

$$\forall v \in K, \quad J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v - u \rangle_{V',V}$$

Caractérisation pour des ensembles généraux (1)

- Ensemble $\mathcal{K}(u)$ des vecteurs de V **tangents à une courbe de K** passant par u

$$\varphi(0) = u, \quad \varphi'(0) = z \in \mathcal{K}(u)$$

où $\varphi : [0, t_0] \rightarrow K$ (c'est-à-dire $\varphi(t) = u + tz + o(t)$)

Caractérisation pour des ensembles généraux (2)

- $\mathcal{K}(u)$ **cône des directions admissibles** en $u \in K$
 - $0 \in \mathcal{K}(u)$ donc $\mathcal{K}(u)$ n'est pas vide
 - $\mathcal{K}(u)$ est un **cône** (si $z \in \mathcal{K}(u)$, alors $\lambda z \in \mathcal{K}(u)$ pour tout $\lambda \geq 0$)
 - si u est un point intérieur, $\mathcal{K}(u) = V$
 - $\mathcal{K}(u)$ est **fermé**

Condition nécessaire de minimum local

Si $K \subset V$ est fermé et si $J : V \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable et admet un minimum local en u , alors

$$\forall z \in \mathcal{K}(u), \quad \langle J'(u), z \rangle_{V',V} \geq 0$$

Contraintes égalité (1)

- Cas particulier $K = \{v \in V \mid \Phi(v) = 0\}$

- Application $\Phi : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable :

$$\Phi(v) = (\Phi_1(v), \Phi_2(v), \dots, \Phi_m(v))$$

où chacune des fonctionnelles $\Phi_i : V \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable

- Prenez une minute pour réfléchir à ces deux questions...

- K est-il **fermé** ?
- K est-il **convexe** ?

Contraintes égalité

Contraintes égalité (2)

- Contraintes **qualifiées** en $u \in K$ si la famille suivante est **libre** dans V'

$$\{\Phi'_1(u), \Phi'_2(u), \dots, \Phi'_m(u)\}$$

Condition **nécessaire** vérifiée en un **minimum local** $u \in K$

- fonctionnelle $J : V \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable
- contraintes **qualifiées** en $u \in K$

Existence et **unicité** des **multiplieurs de Lagrange** $(p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^m$

$$J'(u) + \sum_{i=1}^m p_i \Phi'_i(u) = 0$$

- Pas de réciproque en général (caractérisation des **points critiques**)

Contraintes égalité (3)

Exemple : fonctionnelle quadratique

- On considère $V = \mathbb{R}^N$, $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ **symétrique définie positive**, $b \in \mathbb{R}^N$

$$J(v) = \frac{1}{2} (Av, v)_{\mathbb{R}^N} - (b, v)_{\mathbb{R}^N}$$

- Contrainte** $K = \{v \in V \mid \Phi(v) = 0\}$, où, pour $d \in \mathbb{R}^N$ et $c \in \mathbb{R}$,

$$\Phi(v) = (d, v)_{\mathbb{R}^N} - c$$

- Question** : Montrer que si u est le minimiseur de J , alors il existe $p \in \mathbb{R}$ tel que

$$Z \begin{pmatrix} u \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad Z = \begin{bmatrix} A & d \\ d^t & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1, N+1}$$

Montrer également que Z est inversible.

Contraintes inégalité

Contraintes inégalité (1)

- Cas particulier $K = \{v \in V; \Phi(v) \leq 0\}$ avec
 - $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_m) : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable
 - $\Phi(v) \leq 0$ signifie $\Phi_i(v) \leq 0$ pour tout $i \in \{1 \dots m\}$
- Propriétés de K :
 - fermé** car Φ_i continues,
 - convexe** si les applications Φ_i sont **convexes**

Contraintes actives

La i -ème contrainte est dite **active** en $u \in K$ si $\Phi_i(u) = 0$.
L'ensemble des contraintes actives en $u \in K$ est noté

$$A(u) := \{i \in \{1 \dots m\}; \Phi_i(u) = 0\}.$$

Contraintes inégalité (2)

Exemple : $K = \{v = (x, y) \in \mathbb{R}^2; \Phi_1(v) := x \leq 0, \Phi_2(v) := y \leq 0\}$
 Déterminer l'ensemble des contraintes actives aux points $u_1, \dots, u_5$

Contraintes inégalité (3)

- Contraintes dites **qualifiées** en $u \in K$
 - soit si toutes les applications Φ_i sont **affines**
 - soit si la famille $\{\Phi'_i(u)\}_{i \in \mathcal{A}(u)}$ est libre (dans V')
 - sert à simplifier l'exploration du cône des directions admissibles

Condition nécessaire de minimalité locale

On suppose que $J : K \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $u \in K$ et que les contraintes sont qualifiées en u .

Si u est un minimum local, alors il existe des multiplicateurs de Lagrange $(p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{R}_+^m$ tels que

$$J'(u) + \sum_{i=1}^m p_i \Phi'_i(u) = 0 \quad (\in V')$$

$$(\Phi(u), p)_{\mathbb{R}^m} := \sum_{i=1}^m p_i \Phi_i(u) = 0 \quad (\in \mathbb{R})$$

Contraintes inégalité (4)

- Les multiplicateurs de Lagrange ne sont **pas forcément uniques**
- **Condition des écarts complémentaires (2)**
 - Comme $p_i \geq 0$ et $\Phi_i(u) \leq 0$ pour tout $i \in \{1 \dots m\}$, on a

$$p_i \Phi_i(u) = 0 \quad \forall i \in \{1 \dots m\}$$

- Si $p_i > 0$ alors la i -ème contrainte est **active** ($\Phi_i(u) = 0$)
- Si la i -ème contrainte n'est **pas active** ($\Phi_i(u) < 0$) alors $p_i = 0$

Réciproque (Kuhn & Tucker)

On suppose J et $\{\Phi\}_{1 \leq i \leq m}$ **convexes**, contraintes inégalité qualifiées en $u \in K$.

Alors u est un minimiseur global de J dans K si et seulement si (1) et (2) sont satisfaites.

Conclusion

- **Minimisation avec contraintes :**

- conditions sur la fonctionnelle et l'ensemble de minimisation pour **existence/unicité** du minimiseur
- **caractérisation** du minimum local pour
 - ensembles convexes généraux
 - contraintes égalité
 - contraintes inégalité

- **Au menu de la suite :**

- un **TD** sur la minimisation sans contrainte (tout de suite !)
- un **TP** la semaine prochaine
- un **TD** sur la minimisation avec contrainte le 26 mars