

SCILAB à l'École nationale des ponts et chaussées

<http://cermics.enpc.fr/scilab>

Interpolation et approximation polynomiale

Les réponses

Licence de mathématiques Nouméa 2004

Jean-Philippe CHANCELIER

(avec le soutien du Ministère de l'Outre-Mer)

15 mars 2005 (dernière date de mise à jour)

Table des matières

1	Interpolation polynomiale : matrice de Vandermonde	1
2	Polynôme d'interpolation de Lagrange	3
3	Évaluation du polynôme d'interpolation de Lagrange par l'algorithme de Neville	5
4	Différences divisées	6
5	Fonction de Lebesgue, points de Tchebychev	9
6	Approximation en norme L^∞ polynômes de Bernstein	10

1 Interpolation polynomiale : matrice de Vandermonde

On cherche à résoudre le problème d'interpolation polynomiale par résolution du système linéaire obtenu en écrivant le système de $n + 1$ équations à $n + 1$ inconnues. On cherche donc l'unique polynôme de degré n passant par les points $(x_i, f_i)_{i=0,\dots,n}$. Les points $(x_i)_{i=0,\dots,n}$ étant tous distincts.

$$P_n(x_i) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^n a_j x_i^j = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n \quad (1)$$

Soit en notation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1^1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n^1 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix} \quad (2)$$

```
-->function y=f(x)                                ← La fonction que l'on cherche à interpoler
-->  y=10./(1+x.*x)
-->endfunction

-->n=5 ;
-->x=linspace(-5,5,n)';                             ← Les points d'interpolation régulièrement espacés

-->V=(x*ones(1,n)).^( ones(n,1)*[0:n-1]);  ← Construction de la matrice de Vandermonde

-->F=f(x);                                           ← Les points d'interpolation (x,F)

-->a = V \ F                                         ← Résolution du système linéaire
a =

!   1.           !
!   2.469D-17 !
!  - 0.1710875 !
!  - 9.876D-19 !
!   0.0053050 !

-->Pn=poly(a,"x","coeff")                          ← Construction du polynome d'interpolation
Pn =

                2                3                4
1 + 2.469D-17x - 0.1710875x - 9.876D-19x + 0.0053050x

-->nr=200;
-->xr=linspace(-5,5,nr)';
-->yr=f(xr);
-->yp=horner(Pn,xr);                                ← Évaluation du polynôme aux points xr avec horner
-->xbasc();
-->plot2d1("onn",xr,[yr,yp])                        ← Voir figure 1
-->plot2d(x,F,-2);
```

Noter que le conditionnement du Vandermonde se dégrade très vite si l'on augmente le nombre de points et que le système linéaire devient numériquement singulier pour $n = 15$ par exemple :




FIG. 1 – Interpolation $n = 5$ par résolution du système linéaire

```
-->vcond=[];
-->for n=[5,10,20]
-->  x=linspace(-5,5,n)';
-->  V=(x*ones(1,n)).^(ones(n,1)*[0:n-1]);
-->  vcond=[vcond,cond(V)];
-->end

-->mprintf('n=5 %5.3e, n=10 %5.3e, n=20 %5.3e',vcond);    ←Conditionnement pour n =
5, 10 et 20
n=5 9.043e+02, n=10 5.083e+06, n=20 4.874e+14
```

2 Polynôme d'interpolation de Lagrange

On utilise directement les polynômes de Lagrange pour réaliser l'interpolation polynomiale. Le i -ème polynôme de Lagrange s'écrit :

$$L_i(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} \quad (3)$$

Et le polynôme d'interpolation s'écrit alors :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x) \quad (4)$$

```
-->for n=5:20
-->  x=linspace(-5,5,n)';    ← Les points d'interpolation régulièrement espacés
```

```

--> F=f(x);                                ← Les points d'interpolation (x,F),  $f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 1/(1+x^2)$ 
--> clear P;
--> for i=1:n
-->     y=x; y(i)=[];                        ← Les  $x_j$  en retirant le  $i$ -ème
-->     P(i)= poly(y,"x");
-->     P(i)= P(i)/horner(P(i),x(i));        ← Le  $i$ -ème polynôme de Lagrange
--> end
--> Pn= F'*P;                               ← Le polynôme d'interpolation
--> nr=200;
--> xr=linspace(-5,5,nr)';
--> yr=f(xr);
--> yp=horner(Pn,xr);
--> xbas();
--> plot2d1("onn",xr,[yr,yp])
--> plot2d(x,F,-2);                          ← Voir figure 2 pour  $n=13$ 
--> Norme(n) =maxi(abs(yr-yp));              ← Un estimé de  $\|f - P_n\|^\infty$ 
-->end

-->xbas()
-->plot2d(Norme)                             ← Voir figure 3

```




FIG. 2 – Interpolation $n = 5$ par construction des polynômes de Lagrange




FIG. 3 – $\|f - P_n\|_\infty$ en fonction de n

3 Évaluation du polynôme d'interpolation de Lagrange par l'algorithme de Neville

Pour évaluer le polynôme d'interpolation en un point on peut utiliser l'algorithme de Neville que l'on rappelle ici. Cet algorithme permet en outre une estimation récursive quand on rajoute progressivement des points d'interpolation. Soit $P_{i_0, \dots, i_k}$ le polynôme d'interpolation de degré k passant par les points $(x_{i_p}, f_{i_p})_{p=0, \dots, k}$ on établit facilement la formule récursive suivante :

$$P_{i_0, \dots, i_k} = \frac{(x - x_{i_0})P_{i_1, \dots, i_k} - (x - x_{i_k})P_{i_0, \dots, i_{k-1}}}{x_{i_k} - x_{i_0}} \quad (5)$$

avec

$$P_{i_\alpha} = f_{i_\alpha} \quad (6)$$

Cette formule nous permet de calculer $P_n(x) = P_{0, \dots, n}(x)$ pour une valeur de x fixée. Le programme qui suit implémente l'algorithme de Neville, en travaillant de façon vectorielle sur un ensemble de valeurs `xnev` pour lesquelles on souhaite obtenir la valeur de $P_n(x)$:

```
-->n=6;
-->x=linspace(-5,5,n)';
-->F=f(x);

-->xnev= 1:3;

-->xc=ones(n,1)*xnev - x*ones(1,size(xnev),'*'));
```

← Les points d'interpolation régulièrement espacés
← Les points d'interpolation $(\mathbf{x}, \mathbf{F}), f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 1/(1+x^2)$
← Les points pour lesquels on veut la valeur de P_n
← Matrice $(xnev(j) - x(i))$

```

-->xd=x*ones(1,size(xnev,'*')) ;
-->  Chaque colonne de la matrice col correspond aux
-->  itérations de l'algorithme de Neville pour une valeur fixée de x (xnev(j)).
-->  A la fin des itérations col est un vecteur ligne

-->col=F*ones(1,size(xnev,'*'));                                ← Démarrage de la récursion
-->for k=1:n-1
-->  col= xc(1:$-k,:).*col(2:$,:) - xc((1+k):$,:).*col(1:$-1,:);
-->  col= col0./ (xd((1+k):$,:)-xd(1:$-k,:)); ← Mise à jour (le nombre de lignes de col di-
minue de 1
-->end

-->clear P;
-->for i=1:n
-->  y=x; y(i)=[]; P(i)= poly(y,"x"); P(i)= P(i)/horner(P(i),x(i));
-->end
-->Pn= F'*P;
-->y=horner(Pn,xnev);                                           ← Comparons avec l'interpolation de Lagrange

-->if norm(y-col) > 10*%eps then pause;end

```

4 Différences divisées

L'algorithme de Neville est utilisé pour obtenir la valeur du polynôme d'interpolation en un point. Quand on cherche l'expression du polynôme on peut utiliser les différences divisées et la formule d'interpolation de Newton. On cherche le polynôme d'interpolation sous la forme :

$$P(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{k=0}^{i-1} (x - x_k). \quad (7)$$

Les différences divisées se définissent alors par

$$P_{i_0, \dots, i_k}(x) = f_{i_0} + \sum_{j=1}^n f_{i_0, \dots, i_j} \prod_{k=0}^{j-1} (x - x_k). \quad (8)$$

De la formule de récursion sur les polynômes $P_{i_0, \dots, i_k}$ on déduit, en identifiant les termes de plus haut degrés, une formule de récursion sur les différences divisées :

$$f_{i_0, \dots, i_k} = \frac{f_{i_1, \dots, i_k} - f_{i_0, \dots, i_{k-1}}}{x_{i_k} - x_{i_0}} \quad (9)$$

Le programme qui suit mets en œuvre cette récursion pour construire en Scilab le polynôme d'interpolation. On notera aussi que cette formulation permet à nouveau une construction récursive.

```

-->n=5;
-->x=linspace(-5,5,n)';
-->F=f(x);

-->clear P;
-->for i=1:n-1
-->  P(i)= poly(x(1:i),"x");
-->end
-->P=[1;P]
P =

!   1                               !
!                                   !
!   5 + x                           !
!                                   !
!               2                     !
!   12.5 + 7.5x + x                   !
!                                   !
!               2   3                   !
!   12.5x + 7.5x + x                   !
!                                   !
!               2   3   4               !
! - 31.25x - 6.25x + 5x + x           !

-->
-->
-->col=F;
-->coefP= col(1)*ones(n-1,1);
-->for k=1:n-1
-->  col= col(2:$) - col(1:$-1);
-->  col= col0./ (x((1+k):$)-x(1:$-k));
-->  coefP(k+1)=col(1);
-->end

-->Pn = coefP'*P;

-->nr=200;
-->xr=linspace(-5,5,nr)';
-->yr=f(xr);
-->yp=horner(Pn,xr);
-->pause;xbasc();
plot2d1("onn",xr,[yr,yp])

plot2d(x,F,-2);

```

← Les points d'interpolation régulièrement espacés
 ← Les points d'interpolation $(x,F), f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 1/(1+x^2)$

← La base des polynômes pour la formule de Newton

← On utilise la formule de récursion en conservant les
 ← premiers termes de chaque colonnes qui seront les coefficients du polynôme

← Le polynôme d'interpolation

← Voir figure 4




FIG. 4 – Interpolation par différences divisées

On notera que pour n grand, une évaluation numérique des valeurs du polynôme obtenu par la formule d'interpolation de Newton par la fonction `horner` donne de meilleurs résultats que la même évaluation à partir du polynôme d'interpolation de Lagrange (utiliser la fonction $1/(1+x^2)$)

Le programme suivant montre l'aspect séquentiel de la construction par différence divisées. L'utilisateur rentre les points uns à uns en cliquant, le polynôme d'interpolation est mis à jours séquentiellement et un graphe est dessiné.

```
-->function Pplot(a,b,npts,P)
-->  xr=linspace(a,b,npts)';
-->  yp=horner(P,xr);
-->  plot2d1("onn",xr,yp,1,"000")
-->endfunction

-->P=[1];
-->x=[];F=[];

-->while %t
-->  plot2d([],[],0,rect=[0,0,1,1])
-->  if x<>[]
-->    plot2d(x,F,-2,"000");
-->  end
-->  [but,xnew,fnew]=xclick();
-->  xbasec();
-->  if but==2 then ; break;end
-->  x=[x;xnew];
```



```

--> F=[F;fnew];
--> if size(x,'*') <> 1 ;
-->   P($+1)= poly(x(1:$-1),"x");
-->   [m,n]=size(mat);
-->   mat=[mat,zeros(m,1);zeros(1,n+1)];
-->   mat(n+1,1)=F($);
-->   for j=2:n+1
-->     mat(n+1,j)= (mat(n+1,j-1)-mat(n,j-1))/(x(n+1)-x(n+1-j+1));
-->   end
-->   Pn = diag(mat)'+P;
--> else
-->   mat=[F];
-->   Pn = F;
--> end
--> Pplot(0,1,100,Pn);
-->end

```

5 Fonction de Lebesgue, points de Tchebychev

On regarde dans ce paragraphe le comportement de $\omega(x) = |\prod_{i=0}^n (x - x_i)|$ sur l'intervalle $[-1, 1]$ en fonction du choix des points x_i . On regarde le cas des points régulièrement espacés et le cas des points de Tchebychev :

$$x_i = \cos(\pi(2k + 1)/(2(n - 1) + 2)) \quad k = 0, \dots, n - 1 \quad (10)$$

On fait de même pour la fonction de Lebesgue :

$$\lambda(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=0}^n |L_i(x)| \quad (11)$$

```

-->n=10;
-->x=linspace(-1,1,n)';           ← Les points d'interpolation régulièrement espacés
-->xcheb= cos( %pi*(2*(0:n-1)+1)/(2*(n-1)+2));      ← Les points de Tchebychev

-->w=poly(x,"x");                 ← Le polynôme ω(x) pour les points régulièrement espacés
-->wcheb=poly(xcheb,"x")          ← Le polynôme ω(x) pour les points de Tchebychev
wcheb =

```

$$\begin{aligned}
& - 0.0019531 - 2.408\text{D-}17x + 0.0976562x^2 + 4.341\text{D-}16x^3 \\
& \quad - 0.78125x^4 - 6.767\text{D-}16x^5 + 2.1875x^6 + 3.761\text{D-}15x^7 \\
& \quad - 2.5x^8 - 1.110\text{D-}16x^9 + x^{10}
\end{aligned}$$

```

-->nr=200;

```

```

-->xr=linspace(-1,1,nr)';
-->yr=abs(horner(w,xr));
-->yp=abs(horner(wcheb,xr));
-->xbasc();
-->plot2d1("onn",xr,[yr,yp])

```

← Voir figure 5

```

-->clear P;
-->for i=1:n
-->  y=x; y(i)=[]; P(i)= poly(y,"x"); P(i)= P(i)/horner(P(i),x(i));
-->end

-->clear P1;
-->for i=1:n
-->  y=xcheb; y(i)=[]; P1(i)= poly(y,"x"); P1(i)= P1(i)/horner(P1(i),xcheb(i));
-->end

-->function y=lebesgue(x,P)
-->  y=abs(horner(P,x));  y=sum(y,'r');
-->endfunction

```

← La fonction de Lebesgue

```

-->nr=200;
-->xr=linspace(-1,1,nr);
-->yr=lebesgue(xr,P);
-->yrcheb=lebesgue(xr,P1);

-->pause;xbasc();
plot2d1("onn",xr',[yr;yrcheb]')

```

← Voir figure 6

6 Approximation en norme L^∞ polynômes de Bernstein

On cherche ici à approximer une fonction sur $[0, 1]$ par les polynômes de Bernstein :

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^n C_n^k f(k/n) x^k (1-x)^{n-k} \quad (12)$$

On utilise le fait que pour x fixé dans $[0, 1]$ les coefficients $C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$ sont les probabilités d'une loi binomiale. La fonction Scilab `binomial(x,n-1)` est utilisée pour leurs calculs.

```

-->function y=f(x)
-->  y=sin(5*%pi*x)0./ (1+ 25*x.*x)
-->endfunction

```




FIG. 5 – Fonction $\omega(x)$




FIG. 6 – Fonction de Lebesgue

```

-->nr=200;
-->xr=linspace(0,1,nr)';          ← Les valeurs de  $x$  pour lesquelles on veut évaluer  $B_n(f)(x)$ 
-->yr=f(xr);

-->for n=5:20:200
-->  x=linspace(0,1,n)';
-->  F=f(x);
-->  Bnf=ones(xr);
-->  for i=1:nr
-->    Bnf(i) = binomial(xr(i),n-1)* F;          ← Valeur du  $n$ -
-->    ième polynôme de Bernstein pour  $x=xr(i)$ 
-->  end
-->  plot2d1("onn",xr,[yr,Bnf]);          ← Voir figure 7
-->end

```




FIG. 7 – Une fonction et son approximation par un polynôme de Bernstein $n = 25$

On retrouve de façon directe avec la construction des polynômes de Bernstein la densité pour la norme infinie des polynômes dans les fonction continues sur $[-1, 1]$.