


Loi et chaîne de Markov

TEST D'ÉQUIRÉPARTITION, CALCUL DE PRIX

Bernard Lapeyre

<http://cermics.enpc.fr/~bl>



PLAN

- 1 Chaîne de Markov
- 2 Calcul de loi
- 3 Un test d'équirépartition
- 4 Un calcul de prix
- 5 (bio et biblio)graphie

PROBABILITÉ ET ESPÉRANCE CONDITIONNELLE

- ▶ Une *probabilité* \mathbb{P} sur (Ω, \mathcal{A}) .
- ▶ Une *espérance* \mathbb{E} (qui opère *linéairement* sur des variables aléatoires à valeurs dans \mathbb{R}).
- ▶ *Probabilité conditionnelle* : $A, B \subset E, \mathbb{P}(B) > 0$ par définition

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

- ▶ *Espérance conditionnelle* : $B \subset E, \mathbb{P}(B) > 0, X$ v.a., par définition

$$\mathbb{E}(X|B) = \frac{\mathbb{E}(X\mathbf{1}_B)}{\mathbb{P}(B)}$$

- ▶ $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A|B) = \mathbb{P}(A|B)$, *linéarité*.

LOI D'UN VARIABLE ALÉATOIRE

- ▶ Un espace d'état fini $E = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, une variable aléatoire X à valeur dans \mathbb{E} . Loi de X

$$\mathbb{P}(X = x) = p(x), x \in E$$

- ▶ $\sum_{x \in E} p(x) = 1$.
- ▶ A quoi ça sert ? A calculer $\mathbb{E}(f(X))$ pour toute fonction f de E dans \mathbb{R} !

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in E} p(x)f(x).$$

LOI D'UN VECTEUR ALÉATOIRE I

- ▶ $X = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire valeur dans E^n . Loi de X

$$p_X(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n), x_1, \dots, x_n \in E$$

- ▶ $\sum_{x_1, \dots, x_n \in E} p_X(x_1, \dots, x_n) = 1$.
- ▶ A quoi ca sert? A calculer $\mathbb{E}(f(X_1, \dots, X_n))$ pour toute fonction f de E^n dans \mathbb{R} !

$$\mathbb{E}(f(X_1, \dots, X_n)) = \sum_{x_1, \dots, x_n \in E} p_X(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n).$$

- ▶ Par *contraction*, la loi de X permet de calculer les lois p^i des X_i

$$p_{X_i}(x) = \sum_{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n \in E} p_X(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

LOI D'UN VECTEUR ALÉATOIRE II

- Une remarque simple (mais utile) :

$$\mathbb{E}(f(X_n)) = \sum_{x_n \in E} p_{X_n}(x_n) f(x_n) = \sum_{x_1, \dots, x_n \in E} p_X(x_1, \dots, x_n) f(x_n).$$

LOI D'UN VECTEUR ET INDÉPENDANCE

- ▶ (X_1, \dots, X_n) est un vecteur de v.a. indépendantes si et seulement si (au choix), pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$, pour tout f_1, \dots, f_n de E dans \mathbb{R} :
 - $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = x_n)$
 - $\mathbb{E}(f_1(X_1) \times \dots \times f_n(X_n)) = \mathbb{E}(f_1(X_1)) \times \dots \times \mathbb{E}(f_n(X_n))$
- ▶ les lois marginales p^i des X_i *ne caractérisent pas* la loi du vecteur (X_1, \dots, X_n) !
- ▶ ... sauf si on suppose que ces v.a. sont *indépendantes*.

- 1 Chaîne de Markov
- 2 Calcul de loi
- 3 Un test d'équirépartition
- 4 Un calcul de prix
- 5 (bio et biblio)graphie

SYSTÈME DYNAMIQUE ALÉATOIRE

- ▶ F application de E dans E permet de définir un *système dynamique*: x_0 arbitraire, puis

$$x_{n+1} = F(x_n).$$

- ▶ $W = (W_n, n \geq 1)$ suite de variables aléatoires indépendantes de même loi sur un espace G . "On tire une application de E dans E , au hasard" : $F(x, W_{n+1})$.
- ▶ Système dynamique aléatoire, x_0 arbitraire, on définit par récurrence

$$X_{n+1} = F(X_n, W_{n+1})$$

- ▶ La connaissance de $F(x, w)$ permet de simuler très simplement la suite $(X_n, n \geq 0)$ à partir de la suite W .

SYSTÈMES DYNAMIQUES ALÉATOIRES : 3 EXEMPLES

$(W_n, n \geq 1)$ une suite de tirages à pile ou face indépendants, $0 \leq p \leq 1$.

$$\mathbb{P}(W_n = P) = p = 1 - \mathbb{P}(W_n = F)$$

- ▶ **Marche aléatoire** ($p = 1/2$, marche aléatoire symétrique)

$$X_0 = 0, X_{n+1} = X_n + \left(\mathbf{1}_{\{W_{n+1} = P\}} - \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = F\}} \right).$$

- ▶ **Processus en "dents de scie"**: (# pile consécutifs avant n)

$$X_0 = 0, X_{n+1} = (1 + X_n) \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = P\}}.$$

- ▶ **Processus de Cox-Ross** (cf. finance), $d < 1 < u$

$$X_0 = 1, X_{n+1} = X_n \left(u \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = P\}} + d \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = F\}} \right).$$

- ▶ autres exemples : gestion de stock, battage de cartes
(voir [[Berestycki\(2007\)](#)]), ...

SYSTÈME DYNAMIQUE ALÉATOIRE ET PROPRIÉTÉ DE MARKOV

- ▶ Un système dynamique aléatoire vérifie la *propriété de Markov*

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n) = P(x_n, x_{n+1})$$

- ▶ où P une matrice de transition : $(P(x, y), x, y \in E)$ (parfois aussi noté $(P(x \rightarrow y))$ donnée par

$$P(x, y) = \mathbb{P}(F(x, W_1) = y).$$

- ▶ *Matrice de transition* : $P(x, y) \geq 0$ et $\sum_{y \in E} P(x, y) = 1$.

- ▶ On a forcément $P(x, y) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x)$ et

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n)$$

PREUVE

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1}, X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) \\ &= \mathbb{P}(F(X_n, W_{n+1}) = x_{n+1}, X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) \\ &= \mathbb{P}(F(x_n, W_{n+1}) = x_{n+1}, X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0).\end{aligned}$$

- ▶ $F(x_n, W_{n+1})$ indépendante du vecteur (W_1, \dots, W_n)
- ▶ X_0, \dots, X_n fonctions de (W_1, \dots, W_n) .
- ▶ Donc $F(x_n, W_{n+1})$ indépendante de X_0, \dots, X_n .

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1}, X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) \\ &= \mathbb{P}(F(x_n, W_{n+1}) = x_{n+1}) \mathbb{P}(X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) \\ &= P(x_n, x_{n+1}) \mathbb{P}(X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0)\end{aligned}$$

- ▶ En sommant sur tous les x_0, \dots, x_{n-1} dans E , on obtient aussi

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1}, X_n = x_n) = P(x_n, x_{n+1}) \mathbb{P}(X_n = x_n).$$

MATRICE DE TRANSITION : EXEMPLES

- ▶ Exemple 1 : $x \in \mathbf{Z}$, $P(x, x + 1) = p$, $P(x, x - 1) = 1 - p$, 0 sinon
- ▶ Exemple 2 : $x \in \mathbb{N}$, $P(x, x + 1) = p$, $P(x, 0) = 1 - p$, 0 sinon
- ▶ Exemple 3 : $P(x, xu) = p$, $P(x, xd) = 1 - p$, 0 sinon

SYSTÈME DYNAMIQUE ALÉATOIRE ET CHAÎNE DE MARKOV

- ▶ une suite de variables aléatoires qui vérifie la propriété de Markov, s'appelle une *chaîne de Markov*.
- ▶ $P(x, y) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x)$, $x, y \in E$, est la *matrice de transition* de la chaîne de Markov.
- ▶ Un système dynamique aléatoire est une chaîne de Markov et réciproquement on peut représenter (en loi) une chaîne de Markov comme un système dynamique aléatoire.
- ▶ La matrice de transition $P(x, y)$ se déduit de F et de la loi de W .
- ▶ P contient toute l'information utile pour mener à bien les calculs de loi concernant la chaîne.
- ▶ Pour *simuler* une chaîne de Markov, on utilise une représentation comme système dynamique aléatoire.

CHAÎNE DE MARKOV : DÉFINITION

Definition 1

Une suite de v.a. $(X_n, n \geq 0)$ à valeurs dans E est un chaîne de Markov de *matrice de transition* $(P(x, y), x \in E, y \in E)$, si et seulement si, par définition, pour tout $x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in E$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n) \\ &= P(x_n, x_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n)\end{aligned}$$

La loi de X_0 , μ_0 , est appelée la *loi initiale*.

- ▶ Formellement, égalité vrai seulement si $\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n) > 0$, sinon l'interpréter comme

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n, X_{n+1} = x_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n)P(x_n, x_{n+1}).\end{aligned}$$

- ▶ Matrice de transition P_n dépendant de n : chaîne de Markov *inhomogène*.

- 1 Chaîne de Markov
- 2 Calcul de loi
- 3 Un test d'équirépartition
- 4 Un calcul de prix
- 5 (bio et biblio)graphie

MATRICE DE TRANSITION ET CALCUL DE LOIS

- ▶ E fini
- ▶ $(X_n, n \geq 0)$ une chaîne de Markov de matrice de transition P sur E .
- ▶ μ_0 la loi de X_0 (loi initiale), $\mu_0(x) = \mathbb{P}(X_0 = x)$, $x \in E$.
- ▶ La loi du vecteur (X_0, \dots, X_n) se calcule explicitement en fonction de P et μ_0

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = \mu_0(x_0)P(x_0, x_1) \times \dots \times P(x_{n-1}, x_n).$$

- ▶ Preuve = propriété de Markov

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n) \\ = \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1})P(x_{n-1}, x_n), \end{aligned}$$

puis on itère.

MATRICE DE TRANSITION : QUELQUES NOTATIONS

- ▶ E fini : μ est un vecteur ligne, P une matrice et f un vecteur colonne.
- ▶ $(Pf)(x) = \sum_{y \in E} P(x, y)f(y)$, f une fonction de E dans \mathbb{R} . Pf est aussi une fonction de E dans \mathbb{R} .
- ▶ $(\mu P)(y) = \sum_{x \in E} \mu(x)P(x, y)$, μ une loi de probabilité sur E . μP est aussi une probabilité sur E
- ▶ $(PQ)(x, y) = \sum_{z \in E} P(x, z)Q(z, y)$, pour P et Q deux matrices de transition. PQ est aussi une matrice de transition.
- ▶ P^n est définie par récurrence par :
$$P^{n+1}(x, y) = \sum_{z \in E} P(x, z)P^n(z, y).$$
- ▶ μ loi sur E , f fonction de E dans \mathbb{R} : $\mu f = \sum_{x \in E} \mu(x)f(x)$.
- ▶ Si X a pour loi μ , $\mathbb{E}(f(X)) = \mu f$.

LOI DE X_n

- ▶ Par contraction de la loi du vecteur (X_0, \dots, X_n) , on obtient

$$\mathbb{P}(X_n = x_n) = \sum_{x_0, x_1, \dots, x_{n-1} \in E} \mu_0(x_0) P(x_0, x_1) \times \dots \times P(x_{n-1}, x_n).$$

- ▶ avec les notations précédentes :

$$\mathbb{P}(X_n = x_n) = (\mu_0 P^n)(x_n),$$

- ▶ $\text{loi}(X_n) = \mu_0 P^n$: un (simple) calcul matriciel à partir de μ_0 et P .

- 1 Chaîne de Markov
- 2 Calcul de loi
- 3 Un test d'équirépartition**
- 4 Un calcul de prix
- 5 (bio et biblio)graphie

UN TEST D'ÉQUIRÉPARTITION

- ▶ Ces 100 tirages à pile ou face (réalisé par mes soins!) sont ils vraiment "aléatoire"?

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | F | F | P | F | P | P | F | F |
| F | P | P | P | F | F | P | F | P | F |
| P | F | F | F | P | P | F | F | P | P |
| P | F | F | P | F | P | P | F | F | P |
| F | P | P | F | P | P | F | F | F | P |
| P | P | F | P | F | P | P | F | P | P |
| F | F | P | F | P | P | F | F | P | F |
| P | F | F | F | P | F | P | P | F | F |
| P | F | F | F | P | P | P | F | P | F |
| P | F | F | P | P | F | P | F | P | P |

- ▶ Ça n'a pas l'air trop mal : 50P, 50F ...

UN TEST D'ÉQUIRÉPARTITION

- ▶ mais ... le nombre maximum de piles consécutifs est de 3, ce qui est (très) peu compatible avec l'hypothèse d'un tirage au hasard.
- ▶ On a du mal à imiter le hasard, ...
- ▶ Nous allons voir qu'il faut s'attendre à 4 piles consécutifs (avec proba 0.97) voire 5 (avec proba 0.81).
- ▶ On a plus de chance de voir 10 piles consécutifs (ou plus) que d'en voir 3 ou moins !
- ▶ On va calculer la loi du nombre maximum de piles consécutifs au bout de 100 tirages.

CHAÎNE DE MARKOV ARRÊTÉE

- ▶ $(X_n, n \geq 0)$ un système dynamique aléatoire

$$X_{n+1} = F(X_n, W_{n+1}).$$

- ▶ $x \in E, \tau = \inf \{n \geq 0, X_n = x_0\}$: le premier temps d'atteinte de x_0 (pas forcément fini, $+\infty$ si ensemble vide).
- ▶ $n \wedge \tau = \inf \{n, \tau\}$
- ▶ $Y_n = X_{n \wedge \tau}$ est aussi un système dynamique aléatoire (et donc une chaîne de Markov) puisque

$$Y_{n+1} = F(Y_n, W_{n+1})\mathbf{1}_{\{Y_n \neq x_0\}} + x_0\mathbf{1}_{\{Y_n = x_0\}} = G(Y_n, W_{n+1}).$$

$$G(x, u) = F(x, u)\mathbf{1}_{\{x \neq x_0\}} + x_0\mathbf{1}_{\{x = x_0\}}$$

CHAÎNE EN DENTS DE SCIE ARRÊTÉE

- ▶ X la chaîne en dents de scie, $l > 0$, $\tau_l = \inf \{n \geq 0, X_n = l\}$,
 $Y_n^l = X_{n \wedge \tau_l}$.
- ▶ Y_n^l est un chaîne de Markov à valeurs dans $\{0, \dots, l\}$ de matrice de transition P donnée par (les autres éléments sont nuls) :

$$\begin{cases} P_l(x, x+1) = p & \text{si } x < l, \\ P_l(x, 0) = 1-p & \text{si } x < l, \\ P_l(l, l) = 1. \end{cases}$$

$$P_l = \begin{pmatrix} 1-p & p & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1-p & 0 & 0 & \dots & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & \dots & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

LOI DU NOMBRE DE PILES CONSÉCUTIFS APRÈS 100 TIRAGES

- ▶ N_{\max}^n : nombre maximum de piles consécutifs après n tirages.
- ▶ $\{Y_n^l = l\} = \{N_{\max}^n \geq l\}$.
- ▶ $\mathbb{P}(Y_0^l = 0) = 1$. Loi initiale $\mu_0(0) = 1, \mu_0(k) = 0$ sinon.
 $\mu_0 = (1, 0, \dots, 0)$.
- ▶ Loi de $Y_n^l = \mu_0(P_l)^n = (P_l^n(0, k), 0 \leq k \leq l)$ (un vecteur ligne).
- ▶ $\mathbb{P}(Y_n^l = l) = (P_l)^n(0, l)$.
- ▶ Il est facile d'écrire un programme `Python` qui fait cela (cf. TD).
- ▶ On peut calculer la loi du nombre de piles consécutifs maximum après 100 tirages N_{\max} .

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_{\max}^{100} = l) &= \mathbb{P}(Y_{100}^l = l) - \mathbb{P}(Y_{100}^{l+1} = l + 1) \\ &= P_l^{100}(0, l) - P_{l+1}^{100}(0, l + 1).\end{aligned}$$

LOI DU NOMBRE MAXIMUM DE PILES CONSÉCUTIFS




Figure: Loi du nombre de piles consécutifs.

- ▶ $\mathbb{P}(\text{nombre de piles consécutifs} \leq 3) = 0.0273$
- ▶ $\mathbb{P}(\text{nombre de piles consécutifs} \geq 5) = 0.8101$

UNE RÉGLE DE DÉCISION

- ▶ Si l'on voit **au moins 4 piles consécutifs**, la suite sera déclarée aléatoire, sinon, la suite sera déclarée non aléatoire.
- ▶ Si la suite a été tirée aléatoirement, je vais me tromper avec moins de 3% d'erreur.
- ▶ Si la suite n'est pas aléatoire, je suis aidé par la tendance naturelle à ne pas faire de trop longues series.
- ▶ "Mon" exemple ne passe pas le test. Mais si on le lit par colonne ou lieu de ligne, il le passe aisément!
- ▶ À vérifier avec l'un de vos camarades, si vous êtes sceptique.

- 1 Chaîne de Markov
- 2 Calcul de loi
- 3 Un test d'équirépartition
- 4 Un calcul de prix
- 5 (bio et biblio)graphie

LOI DE X_n : UNE AUTRE FAÇON D'ÉCRIRE LES CHOSES

- ▶ $(X_n, n \geq 0)$ chaîne de Markov de matrice de transition P sur E .
- ▶ $\mathbb{P}(X_0 = x_0) = 1$ (i.e. $\mu_0(x_0) = 1, \mu_0(x) = 0$ si $x \neq x_0$.)
- ▶ On sait exprimer $\mathbb{E}(f(X_N))$

$$\mathbb{E}(f(X_N)) = \mu_N f = \mu_0 P^N f = \sum_{x \in E} \mu_0(x) (P^N f)(x) = (P^N f)(x_0).$$

Une formulation alternative plus algorithmique.

Theorem 2

Soit $(u(n, x), n = 0, \dots, N, x \in E)$ la solution unique de

$$(1) \quad \begin{cases} u(n, x) = \sum_{y \in E} P(x, y) u(n+1, y), & n < N \\ u(N, x) = f(x), \end{cases}$$

Alors $\mathbb{E}(f(X_N)) = u(0, x_0)$.

REMARQUES

- ▶ La première équation de (1) peut aussi s'écrire

$$u(n, x) = P[u(n+1, \cdot)](x) = \sum_{y \in E} P(x, y)u(n+1, y)$$

- ▶ $u(n, x)$ peut s'interpréter comme

$$u(n, x) = \overbrace{P \times \cdots \times P}^{N-n \text{ fois}} f(x) = P^{N-n}f(x),$$

- ▶ Lorsque $\mathbb{P}(X_n = x) > 0$, on a

$$u(n, x) = \mathbb{E}(f(X_N) | X_n = x) = P^{N-n}f(x).$$

PREUVE

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n, X_{n+1} = x_{n+1}, \dots, X_N = x_N) \\ = \mathbb{P}(X_0 = x_0)P(x_0, x_1) \times \dots \times P(x_n, x_{n+1}) \times P(x_{n+1}, x_{n+2}) \times \dots \times P(x_{N-1}, x_N)\end{aligned}$$

en sommant sur toutes les valeurs de x_0, \dots, x_{n-1} et x_{n+1}, \dots, x_{N-1} on obtient la loi de (X_n, X_N)

$$\mathbb{P}(X_n = x_n, X_N = x_N) = \mathbb{P}(X_n = x_n)P^{N-n}(x_n, x_N)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(f(X_N)\mathbf{1}_{\{X_n = x_n\}}\right) &= \mathbb{P}(X_n = x_n) \sum_{x_N \in E} P^{N-n}(x_n, x_N)f(x_N) \\ &= \mathbb{P}(X_n = x_n)(P^{N-n}f)(x_n)\end{aligned}$$

REMARQUES ET NOTATIONS

- ▶ (1) est une *équation de programmation dynamique*
- ▶ E est fini, (1) est un *algorithme* qui termine.

UNE NOTATION COMMODE “À LA Scilab”

- ▶ $x_{0:n}$ plutôt que (x_0, \dots, x_n)
- ▶ $X_{0:n}$ plutôt que (X_0, \dots, X_n)
- ▶ $X_{0:n} = x_{0:n}$ plutôt que $(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n)$

PREUVE FORMELLE

On le sait déjà ... mais voici une autre méthode de preuve. On va montrer que

$$\mathbb{E}(u(n+1, X_{n+1})) = \mathbb{E}(u(n, X_n)).$$

Si cela est vrai :

$$u(0, x_0) = \mathbb{E}(u(0, X_0)) = \dots = \mathbb{E}(u(N, X_N)) = \mathbb{E}(f(X_N)).$$

La loi de $X_{0:n+1} = (X_{0:n}, X_{n+1})$ est donnée par (c'est un façon d'exprimer la propriété de Markov)

$$\mathbb{P}(X_{0:n+1} = x_{0:n+1}) = \mathbb{P}(X_{0:n} = x_{0:n}, X_{n+1} = x_{n+1}) = \mathbb{P}(X_{0:n} = x_{0:n})P(x_n, x_{n+1}).$$

$$\mathbb{E}(u(n+1, X_{n+1})) = \sum_{x_{0:n+1} \in E^{n+2}} u(n+1, x_{n+1}) \mathbb{P}(X_{0:n+1} = x_{0:n+1}),$$

$$\text{[propriété de Markov]} = \sum_{x_{0:n} \in E^{n+1}, x_{n+1} \in E} u(n+1, x_{n+1}) \mathbb{P}(X_{0:n} = x_{0:n}) P(x_n, x_{n+1}),$$

$$= \sum_{x_{0:n} \in E^{n+1}} \mathbb{P}(X_{0:n} = x_{0:n}) \sum_{x_{n+1} \in E} P(x_n, x_{n+1}) u(n+1, x_{n+1}),$$

$$\text{[définition de } u(n, \cdot)\text{]} = \sum_{x_{0:n} \in E^{n+1}} \mathbb{P}(X_{0:n} = x_{0:n}) u(n, x_n) = \mathbb{E}(u(n, X_n)).$$

CALCUL DU PRIX D'UNE OPTION

- ▶ Un modèle : le processus de Cox-Ross

$$X_0 = x_0, X_{n+1} = X_n \left(u \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = P\}} + d \mathbf{1}_{\{W_{n+1} = F\}} \right).$$

- ▶ Un profil d'option $f(X_N)$ (ce que je vais recevoir en N)

$$f(x) = (x - K)_+, \text{ option d'achat de prix d'exercice } K.$$

- ▶ Prix : $\mathbb{E}(f(X_N))$ ("intuitif", voir cours de maths financière 2A).
- ▶ Calcul du prix : $(u(n, x), n = 0, \dots, N, x \in E)$

$$(2) \quad \begin{cases} u(n, x) = pu(n+1, xu) + (1-p)u(n+1, xd), \\ u(N, x) = f(x). \end{cases}$$

- ▶ $\mathbb{E}(f(X_N)) = u(0, x_0).$

UN PROGRAMME

Un programme en Python, **catastrophique** (complexité 2^N), mais qui a le bon goût de terminer (lentement)


```
N=10;p=1/2;
down=1/2;up=2;
K=1;

def f(x): return max(x-K,0)

def u(n,x):
    if n==N:
        return f(x);
    else:
        return p * u(n+1,x*up) + (1-p) * u(n+1,x*down);

def prix_rec(x): return u(0,x)
```

POUR ALLER PLUS VITE, UN DESSIN POUR $N = 3$



UN ALGORITHME QUI FAIT LA MÊME CHOSE, PLUS VITE ...

- ▶ Si $X_0 = x_0$ les seules valeurs que peut prendre X_n sont données par ($k =$ nombre de fois où l'on tire u entre 0 et $n - 1$)

$$(x_k^{(n)} = x_0 u^k d^{n-k}, 0 \leq k \leq n).$$

- ▶ Il suffit de calculer les vecteurs $U^{(n)} = (u(n, x_k^{(n)}), 0 \leq k \leq n)$, qui vérifient

$$(3) \quad \begin{cases} U^{(N)}(k) = f(x_k^{(N)}), & k = 0, \dots, N \\ U^{(n)}(k) = pU^{(n+1)}(k+1) + (1-p)U^{(n+1)}(k), & k = 0, \dots, n. \end{cases}$$

- ▶ Ce qui donne un algorithme (de complexité N^2).

UN ALGORITHME QUI FAIT LA MÊME CHOSE, PLUS VITE ...

```
def prix_iter(x_0):  
    U=np.zeros((N+1,N+1))  
    for k in range(N+1): # = intervalle [0,1,...,N]  
        U[N,k] = f(x_0 * up**k * down**(N-k))  
  
    for n in range(N-1,-1,-1): # = intervalle [N-1,N-2,...,0]  
        for k in range(n+1): # intervalle [0,1,...,n]  
            U[n,k] = p*U[n+1,k+1]+(1-p)*U[n+1,k]  
    return U[0,0]
```

ANDRY MARKOV

- ▶ Mathématicien russe 1856 – 1922, élève de Chebyshev, “known for his work in number theory, analysis, and probability theory.”
- ▶ ... “He introduced a new sequence of dependent variable, called a chain, as well as a few basic concepts of chains such as transition probabilities, irreducibility and stationarity. His ideas were taken up and developed further by scientists around the world and now the theory of Markov Chains is one of the most powerful theories for analyzing various phenomena of the world”



A. A. Markov (1886).

Pour des détail sur la vie et l'œuvre de Markov voir [[Basharin et al.\(2004\)](#)[Basharin, Langville, and Naumov](#)].

POUR ALLER PLUS LOIN : COURS DE L'ÉCOLE DES PONTS

- ▶ 2A : cours "Processus Aléatoires"
- ▶ cours "Méthodes Mathématiques pour la Finance"

BIBLIOGRAPHIE



Gely P. Basharin, Amy N. Langville, and Valeriy A. Naumov.

The life and work of A. A. Markov.
Linear Algebra Appl., 386:3–26, 2004.



Nathanaël Berestycki.

Notes on card shuffling.
Technical report, <http://www.statslab.cam.ac.uk/~beresty/Articles/shuffle.pdf>, 2007.



Jean-François Delmas and Benjamin Jourdain.

Modèles aléatoires.
Mathématiques & Applications. Springer-Verlag, Berlin, 2006.



Stuart Dreyfus.

Richard bellman on the birth of dynamic programming.
Operations Resarch, 50(1):48–51, 2002.



Carl Graham.

Chaînes de Markov.
Dunod, 2008.



Damien Lambertson and Bernard Lapeyre.

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
Ellipses, Edition Marketing, Paris, second edition, 1997.